

街貓TNR

Neighborhood Cats of New York City 著

Meetpets工作群 譯

什麼是TNR?

TNR是英文trap（捕捉）、neuter（結紮）、release（放養）的縮寫，是現今唯一經過證實能有效控制街貓數量的辦法。TNR的任務是儘可能地把一個群落（colony）的貓全部捕捉起來，施以結紮手術後，放回牠們原來生活的地方。結紮後的貓以剪去耳朵一角作為標記，原地放養後由愛心照顧者繼續提供食物及照顧，並予以觀察、紀錄。如果有還來得及馴養的小貓以及親人的成貓，則幫助牠們找到合適的認養家庭。

假設一個群落超過百分之七十的成貓都能夠成功結紮，在數量的控制上便可得到立竿見影的效果。若結紮比率接近百分之百，則長期來看，街貓的數量便會逐步下降。除此之外，街貓最令人困擾的行為，像因打架和求偶引起的哭號，以及公貓為標記地盤而噴灑尿液等問題行為，也會大大地減少。貓較無四處遷徙的習慣，因此也較不易被人察覺，牠們能夠對其活動範圍內的鼠害加以控制，對都會地區的居民來說，街貓其實是很好的鄰居。

以社區的規模來說，TNR有數項優點：首先，結紮街貓能使當地收容所少抓些貓，因而降低安樂死的比率。舉個例子，在美國的聖地牙哥鄉間，施行TNR短短兩年的成果，便使安樂死的比率降低百分之四十。在舊金山市區，在六年的TNR努力下，使得所有貓（包括街貓及家貓在內）的安樂死比率驟降百分之七十。家貓被安樂死的數量減少，主要原因是街上的貓減少了，認養單位待認養的家貓競爭對手跟著減少之故。

另一項潛在的好處是，如果大規模進行TNR，便能夠節省公家在動物控管方面的成本。按過去傳統的作法，大部份人力物力的花費都是在捕捉街貓、收容期間的餵養和管理，以及安樂死的施行等等。相較之下，TNR的花費只限於結紮和施打預防針之上，其餘的工作——捕捉、餵養等，都由志工所承擔。以佛羅里達的橘郡為例，實施TNR兩年半後，相關公家單位的成本節約了百分之四十七（以此案例而言，確切的金額是十萬零九千美元）。

TNR能夠動員大量的志工，因為它是肯定生命價值的工作。捕捉社區裡大量的街貓需要許多志工的參與，公家單位能做的只是杯水車薪，看不出成效。如果被捕捉到的貓最終命運是安樂死的話，不會有志工願意主動幫忙，但如果人們知道貓咪最後會被放養，並受到妥善照顧的話，經驗一再告訴我們，大家都會樂意伸出援手。

失敗的計劃

如果方法正確而且實施得宜，TNR不僅能有效控制街貓數量，而且是唯一獲得成功的實例！應付街貓，傳統的作法是撲殺，也就是由公家單位捕捉街貓，而後一視同仁施以安樂死。然而，以近乎世界各地均出現的街貓過剩問題來看，這個方法的效用其實是完全無效的。以長期的觀察來看，就可以清楚了解為什麼撲殺會失敗了：

首先，一旦參與了TNR工作，便會發現想把整個群落的貓全部捉住是件很困難的事，如果街貓的數量龐大，則必須花上很長一段時間，及很大的耐力。公家單位通常會設一些陷阱，捉到幾隻貓，暫時性地減少了當地貓的數量，但這時，大自然的力量介入了，街貓會很快增加到食物來源可以支持的數量。也就是說，當一個群落的貓數量減少了，剩下的貓便會過度繁殖，一直到食物的來源和消耗再度達到平衡為止，原本減少的數量很快會被補足。

即便假設一個地區的貓能全數清除，長期來看還是不會降低貓群的數量，這就是所謂的「真空效應」(vacuum effect)，這是泰柏(Roger Tabor)在對倫敦的街貓進行研究時所觀察到的現象(參閱：《家貓的野外生活》(*The Wild Life of the Domestic Cat*))，街貓的群落並非單獨存在，而是被鄰近地區其他許多街貓群落所環繞著，如果群落整個被清除，但食物來源仍舊存在的話，鄰近地區的貓群便會進駐，並開始在此繁殖。一般而言，如果一個群落的貓數量足夠，牠們便會一直待在原來的地方。你或許會問：為什麼不乾脆把食物連貓一起清除，斬草除根呢？說起來容易，做起來難。食物的來源可能是垃圾或廚餘，也可能是愛心照顧者放置的貓食，想完全控制這些因子，斷絕食物來源是不切實際的想法。

而上面提到的「愛心照顧者」則是另一項街貓無法完全被消除的因素。愛心照顧者是擇善固執的一群人，他們往往會盡其所能餵養並照顧他們的貓子貓女，甚至不惜違反禁止餵食的規定、跨越私人領土、干預公家捕捉行動等等。撲殺的作法引起這些人的大力反彈。而換個角度思考，TNR卻能動員他們，使他們成為控制街貓數量的龐大資源。

另一種事倍功半的作法，即是救援模式，也就是把所有的貓一視同仁當成家貓，理應成為人類家庭的一份子。這種看法或許有時是值得嘉獎的，像是街貓數量不多的地方，或碰上剛被棄養不久的家貓。但當下的狀況卻不是如此，在許多國家，街貓的數量以動輒以百萬計，一旦過了幼貓期，街貓便很難再與人相處，而且就算是親人的貓，能夠收養牠們的家庭數量根本不夠。許多家貓因為收容所空間不足，而面臨被安樂死的命運，在這種情況下，如果街貓能夠在一個地方按其本性好好生存下去，為什麼還要強加馴養呢？

另一個驅逐貓群的方法，便是減少牠們的食物來源。很多人相信這麼做可以迫使貓到別處覓食，但事實上，剝奪貓群的食物來源往往得到的是反效果——貓群愈來愈逼近人的住所。貓是地域性的動物，基於天性，牠們不會到處遷移。如果該地食物減少，牠們不但不會離開，反而會開始侵入人類的住所覓食。此外，剝奪食物來源，使牠們活活餓死的作法，其實相當殘忍。

TNR是非常人道的，因為這麼做不僅尊重街貓的生存權，並且在可能的情況下提供牠們更高品質的生活。它能有效減少貓群數量，其效用不僅發揮在單一群落，而是整個社區。其他的辦法不只成本高，而且成效不彰。顯然TNR是未來解決街貓問題的時勢所趨。

什麼是街貓

街貓是在某種程度上恢復野外生存本能的貓，牠們一開始可能是走失或被棄養的家貓，後來在郊外或倉庫、廠房、空屋、農舍裡學會如何生存。牠們能適應都市和鄉間的生活，在小巷子、停車場、碼頭等地占地為王。大多數的街貓並不算完全野生，因為牠們仍舊仰賴人們給予食物，不論食物來源是愛心照顧者每天供應的一到二餐，或者餐廳的剩菜剩飯、垃圾等等。光靠狩獵維生的街貓其實少之又少。貓野性的強弱可能跟下列幾項因素有關：首先，貓的年齡，超過六到七週齡的貓，社交的能力逐步減少。在人類家庭以外繁衍了幾代也是另一項重要因素，如果母貓本身曾是家貓的話，她的小貓會比在外面繁殖到第十代的貓更容易被馴化。和人類接觸的頻率是第三種因素，如果貓常和人互動的話，牠的野性會比和人類沒有太多接觸的貓低。最後，貓咪本身的個性也必須被考量在內，那種長久以來生活在外而且也鮮少與人接觸卻非常親人的成貓，我們偶爾也會遇上，但這必竟只是少數，大家必須體認到，如果貓咪的野性很強，那麼最仁慈的選擇可能是讓他繼續在戶外生活。試圖馴養牠們，就跟試圖把松鼠或浣熊當成寵物沒什麼差別——你或許能獲得某種程度上的成功，但完全馴化是絕不可能的，而且需要極大的愛心和耐心。再者，這麼作其實是剝奪了最適合牠們的生活方式。許多人的本意是善良的，他們相信自己把街貓帶回家是在「救」牠，最後卻不能諒解為什麼這些貓一輩子躲在床底下，終日惶恐。自由自在的生活或許危機四伏，但卻是多采多姿的。

落實TNR；以群落為管理單位

以下的步驟是以單一群落為單位，逐步實施TNR，步驟一中有許多教育資源可供參考。

步驟一：教育你自己

在開始管理街貓群落之前，你必須儘可能多加了解TNR。TNR的工作並不只是照顧街貓，也是宣導TNR本身。為了說服大眾，你自己必須對這個問題有深入的了解，幸運的是，有許多教育資源能提供各位以最快的方法學習TNR。

一、Neighborhood Cat的線上教學，標題為「Trap-Neuter-Return: Managing Feral Cat Colonies」(上網: www.suite101.com，點選：Pets& Animals，再點選TNR課程。函授教材為14.95美元，參與互動式討論版為19.95美元)。本課程涵蓋所有TNR開始實施之前所需的知識。發展中國家學生進行相關研究的獎助金申請，歡迎寫信至Animal People詢問 (ANPEOPLE@whidbey.org)。

二、Alley Cat Allies 網站(www.alleycat.org)，這是全美最大的街貓組織，網站內容囊括TNR各個層面。

三、Neighborhood Cats 網站的 info 頁(<http://www.neighborhoodcats.org/info>)。我們的網站提供管理貓群最基本的步驟，方便愛心照顧者一步一步 DIY，另外也有許多祕訣和資訊供各位參考。

步驟二：發展良好的社區關係

街貓的領土通常和人類居住或工作的地點有所重疊，而社區中的人通常都和這些貓有所互動。或許有許多人相當愛護這些貓，並幫忙餵養、照顧牠們，但還是可能有人很討厭貓，想把牠們弄走。不管多數人的態度是什麼，都是我們必須面對，並加以處理的，如此才能確保TNR計劃順利進行。比方說，如果未經地主／屋主的允許，而把結紮後的街貓放回去，則可能造成貓咪被驅逐出境，甚至更嚴重的後果。相反的，在開始捕捉前，把有關TNR的好處傳達給地主／屋主（例如：不會再有小貓、噪音、尿騷味等），並獲得他的首肯，才能使貓群保有長久的平安。

判斷社區居民對街貓抱持何種態度的一個方法，就是到處走動，和居民懇談，尤其是那些常待在戶外的人。談話的方式和態度要專業，準備好一些文獻資料，試著計算街貓的總隻數、什麼人負責餵食、貓通常棲息在哪裡、在該地住了多久、是否有人曾試著對牠們做過什麼事等等。把這些資訊紀錄下來，以後會很有用。跟管理員、屋主或地主談一談。在建物裡工作的人可能對貓是最友善的，因為他們知道貓對控制鼠害的成效。街貓的問題會爆發的原因，通常是因為牠們的數量暴增，而多數人並不知道正確的解決之道，而怪罪這些街貓或愛心照顧者。更重要的一點，是要準備好面對不友善的態度，這時儘量不要引發衝突和口角，而是抱著同理心——如果你每天三更半夜都被貓哭聲吵醒，或者你家的庭院、陽台臭氣薰天，任誰都會很生氣。態度和緩但堅持，解釋為什麼TNR能夠解決問題，而且試圖把貓全部弄走其實是不可能的事。一般人通常能接受較為人道的方法，如果街貓的問題行為能夠解決，多數的人會容許牠們繼續留下。如果有人就是不同意TNR，你必須繼續努力說服他們，由於街貓數量龐大，而且不易馴養，所以放養到他處，或鼓勵認養其實是不切實際的選擇；你必須讓TNR在當地進行，如果能獲得當地公家機關或動物福利組織的支持更好。但不幸的是，大部份的人都是要等吃了苦頭才學會什麼是正確的，投注了許多時間和精力捕捉撲殺之後，才發現一切都是白費力氣，直到那時，他們才會開始接受TNR。

步驟三：設置餵食站和貓屋

開始捕捉和結紮前，先妥善管理貓群。設置餵食站，並在固定時間餵食，由於貓很依賴習慣，因此這麼做可訓練牠們在固定時刻在居定地點現身。如此一來，等到你要捉牠們的時候就很容易了。屆時你可以停止餵食，等貓肚子餓得受不了，就會乖乖走進誘貓籠裡，而且貓會主動靠過來，省得你追著牠們跑。你也可以趁餵食的時候計算貓群的數量，以利結紮和誘貓籠設置的安排。誤判貓群的數量是常有的事，千萬不能道聽途說。

固定餵食的另一項好處是你能夠觀察到是否有幼貓、親人的成貓，或生病的貓。如果有的話，捕捉之前，要先向獸醫報備或安排寄養家庭。在預備捕捉這段期間，盡量提供高

營養的食物，以提高貓咪的免疫力，幫助牠們撐過手術和捕捉所帶來的壓力。幾個星期連續補充營養，也有助疾病的治療，像是上呼吸道感染或錢癬等。如果貓咪的日常飲食營養不夠的話，則強烈建議要這麼做。

貓屋對貓的健康也很重要，冬天的時候，貓群需要溫暖而乾燥的地方休息，Neighborhood cats網站有一些製作冬季貓屋的方法，手續簡單，花費低廉。Alley Cat Allies也有許多資訊可供參考。餵食站的種類最好按照設置地點離愛心照顧者居住地的遠近來決定，可能的話，在能提供遮蔽的木箱之中放幾個碟子，以及自動給水器，木箱的一側保持開放狀態，如此一來，才不會有一隻貓獨占貓屋的狀況發生。如果沒辦法設置木箱的話，儘量把盤子和給水器放在其他人拿不到的地方。如果可以設木箱的話，則把整個裝置放在愛心照顧者能輕易到達，而路過的人卻不容易看到的地方。餵食站的四週保持整潔，大多數的人都不喜歡看到亂七八糟的景象，當地清潔隊想必也是。所以爲了貓的安全，請儘量小心，每天固定清理餵食站，空盤和罐頭請不要亂丟。

步驟四：安排收容場所

如果群落的數量龐大，捕捉整個貓群可能要費時二天以上。從捕捉開始到手術後四十八小時這段期間，你必須找地方安置這些被捉到的貓，誘貓籠可以充當貓咪被釋放前所居住的貓籠，除了進時手術之外，貓必須一直關在裡面（見步驟七：照顧誘貓籠裡的貓）。收容的空間必須夠大，除了容納與貓群數量相當的誘貓籠以外，還能使照顧者方便在籠子中間走動、清潔、餵食。這個地方也最好沒有生人的干擾，不受氣候環境的影響，天冷時最好有暖氣。可以利用的空間包括：車庫、地下室、倉庫、多餘的房間，天氣好的時候甚至住家後院也可以，但別忘了架上遮雨布，以防突然下雨。

把誘貓籠放在桌上，那麼餵食和清潔時會容易一點，不過如果只能放在地上亦無不可。先在底下鋪好塑膠布，再放上誘貓籠。收容的場所最後多少會有點味道，但塑膠布會接住從籠子裡掉出來的東西，清理起來會容易些。趁貓咪在進行手術時，剛好可以把塑膠布捲起來丟掉，再換上新的。等工作結束，貓全都釋放了之後，再全部清理一次即可。氣候溫暖時爲了降低跳蚤感染的可能性，可在每個籠子上鋪一層布，等貓放掉後，仔細清潔各角落並消毒。

步驟五：安排結紮手術

到了此一階段，你和整個社區都已經了解TNR的優點，設置好餵食站和貓屋，並且讓貓群習慣了餵食的時間。你清楚知道貓群的數量，以及是否有幼貓或病貓需要特別照顧，並安排好暫時收容的場所，現在你可以跟動物醫院安排結紮的日期了。理想的狀況下，最好能跟有街貓結紮經驗，且手術效率高的醫院合作。

在紐約，獸醫之間的協定是爲街貓結紮、剪耳及施打狂犬病疫苗，有的還會順便作除蚤和清理耳疥蟲的動作。剪耳的慣例是把貓咪左耳尖端部份剪去1 / 4 英吋，方便貓群在放養後輕易辨別出已結紮過的。其他的方法，像照相、在耳朵上刺青或穿上標籤等，已被證實效果不大。檢驗貓愛滋和白血病(FIV/FeLV)並非標準程序，因爲這些檢驗只會徒增每隻貓的醫療成本，而研究也顯示，街貓罹患這些疾病的比率不會比家貓高（貓愛滋

大約是1-2%；白血病大約是2-4%）。如果我們以防止這些疾病的擴散為目標的話，那麼錢用在結紮會比用在檢驗上要來得經濟。當然了，如果有些貓是考慮要開放認養的，那麼檢驗則是必要的。

步驟六：捕捉

若想了解如何以人道的方法捕捉街貓，Alley Cat Allies網站有一份很好的文件：〈街貓人道捕捉指南〉(“Humane Trapping Instructions for Feral Cats.”)，你也可以在Neighborhood Cats的info頁找到（點選“Trapping – the Basics”）很好的參考資料。我們使用的誘貓籠通常是箱型的，長約三十六吋，後端有門，所以也可以當成收容的籠子用。誘貓籠的設計是爲了使貓進入籠子內吃餌，踏到機關時，籠子門就會關起來（有的籠子機關做得太小，貓常會跨過它而吃到餌，卻不會被關起來，解決的辦法是在機關上加放上一片約六英吋長的厚紙版），如果貓咪在門被關起來後發狂的話，可以用布蓋在籠子上，有助於讓牠放鬆。不過，無論貓的反應如何，用布把籠子蓋起來都是個很值得推薦的方法。

爲了確保捕捉行動能竟其功，最好在此之前二十四小時停止餵食，可能的話，最好一次把所有的貓都捉起來。每次的捕捉一定會有一兩隻貓不願走進誘貓籠裡，那麼只好讓牠多餓幾天。如果一次把所有的貓都結紮了，而不需從一群貓中捕捉被遺漏的一兩隻的話，事情會容易得多。也許在短時間內，大規模的捕捉相當費力，不過，以長遠的眼光來看，其實是比較省事的。這麼做最大的好處就是成效卓著：把一個群落幾乎全數的貓結紮之後，數量的成長和引人厭惡的行爲便受到控制，情況立刻獲得改善。

準備的誘貓籠數量要比貓群的數量多，如果還有一兩隻貓沒抓到，剩下來的幾個誘貓籠會使事情容易的多。剛捉到貓時，除非有貓開始瘋狂衝撞，可能傷害到自己，否則不用急著把捕到貓的誘貓籠收起來，因爲當你走近誘貓籠設置的地方時，很可能把別的貓嚇跑。每移走一個籠子，便在原先的位置上再放一個。不知爲什麼，總會有某些地點特別容易抓到貓。

請注意，捕捉行動一定是在一切準備就緒後才進行，如果未經妥善規劃就冒然行動的話，往往會有很大的麻煩。

步驟七：照顧誘貓籠裡的貓

在Neighborhood Cat網站的info頁有這個程序的詳細說明（附有照片解說）。誘貓籠可以當成收容的籠子，只要用一種分隔器，就可以安全地進行餵食和清潔的工作。分隔器就像一把大型的扁梳，只要把梳齒從籠子的縫隙間插入，就可以隔出一個空間。尤其當貓剛被困住，掙扎著要脫困時，可以用兩片分隔器加強固定。不論什麼時候，籠子都要用布蓋起來，使貓咪保持鎮靜。但要留點空隙通風。街貓的習性喜歡從光亮的地方跑到陰暗的地方，所以如果你希望牠移動到籠子的一端時，只要把布拉起來，遮住你希望牠移動的位置即可，如果這個方法不管用，可以用分隔器稍微推牠一下。等貓鑽到籠子的一端，再用分隔器隔起來，這時照顧者就可放心把門打開，在籠子底部鋪上報紙。接著，再把貓趕到另一端，重覆相同的步驟。你可以趁這個時候換水、加食物。水盆的形狀最好是扁平的，比較不容易打翻。餵食和清理的動作一天兩次。

有的人認為把貓這樣關在籠子裡一連好幾天是很殘忍的，而事實上，被捕捉到的街貓不喜歡明亮而寬敞的感覺，而寧願待在狹小陰暗的空間，因為這樣會使牠們比較有安全感。如果把貓放在大籠子裡，牠們可能只會縮在角落裡而已。誘捕籠通常便足以提供牠們舒適的感覺。只要固定清理餵食，相信牠們在這段期間裡會過得很好。手術前一晚要禁水禁食，貓咪胃裡才不會有東西，否則恐怕在手術過程中嘔吐並嗆入呼吸道。

步驟八：放養後持續監視

手術後只要沒有併發症，應該可在四十八小時內把貓放回原先居住的地方。街貓是地域性的動物，如果想放養到別的地方，通常相當困難，可能必須先在新的居住地限制行動三個禮拜。貓換了新環境很容易走失。結紮後TNR的工作還不能算結束，雖然最艱難的部份已經達成了，但長期持續的追蹤仍是必要的。TNR是以逐漸減少貓群數量為目的，但卻有一大隱憂：被棄養的家貓進駐該群落而沒被發現的話，遲早有一天會繼續繁殖。為了防止這種狀況發生，新到的貓必須立刻捉起來結紮，可以的話，為牠們安排新的認養家庭，否則就放回原處。萬一有的貓沒被抓到，後來生了一窩小貓，那麼小貓必須在約六至七週大時捉起來，方便牠們適應與人相處的生活。

由於情況時常有所變動，因此持續不斷的監視是很重要的。有固定的愛心照顧者管理貓群，萬一有人要抱怨時，才不會有找不到人的狀況。新來的鄰居必須要溝通好，他們或許會介意一些前屋主能夠接受的狀況。有的貓在接受結紮手術後，變得十分友善，以致於不適合再度生活在街上。所以，雖然捕捉和結紮是TNR最重視的程序，但這只是開始，不是結束。照顧是長遠的責任，也是確保TNR任務成功，以及促進貓群健康的不二法門。

以社區為單位的TNR計劃

每個社區都有自己的資源和獨特的狀況，在計劃TNR之前，必須要把所有情境納入考量。TNR最有效的方式，是以社區為單位來進行的，因為這麼一來，可減少未結紮的貓進駐已全面結紮的貓群的機會，而且對當地公立收容所的助益也大得多。下列的條件有助TNR獲得最大成效，不過是否採行則依各地狀況而定：

一、**協調小組**：協調小組是私人的或公立的皆可，但一定要有當地主管單位在法律上的認可。其功用是負責監督TNR計劃、在照顧者和其他單位間居中協調，並確認貓群的數量。有時最好的辦法是在一些已存在的動物福利團體中成立聯盟，或者從已成立的收容所或團體中集結專責小組。

二、**免費結紮服務**：愈是能夠提供免費的結紮及剪耳服務，TNR的效果就愈大，因為即便只是低廉的結紮費用，對一次照顧一大群貓的愛心照顧者而言，都是很大的負擔。請記得，照顧者們已花費許多心力控制貓群的數量，不應該再讓他們自掏腰包支付結紮費用。

三、**誘貓籠租借中心**：為了鼓勵大規模捕捉，設立誘貓籠租借中心是很重要的。要有一個單位負責專門收藏和租借大量的誘貓籠。出借時可要求預付押金，但不可收費。誘貓

籠的規格最好是三十六吋長，附有後門，可用來當成普通的籠子。另外也必須提供分隔器，以利人員安全進行清理及餵食。

四、收容場所：安排收容場所的難易程度依社區性質的不同而異，在人口密度高的住宅區，要找到一次收容十五隻貓將近一個星期的場所可能十分困難，而在郊區，很多人家都有車庫和地下室。最理想的情況是，收容場所跟實施結紮的單位相同，並有志工幫忙清理及餵食。如果沒辦法做到的話，則最好請愛心照顧者負責打理收容場所的維護，如此一來，即使當地主管機關不願承擔照顧街貓可能受傷的風險，仍舊有人可以負責。

五、認養和馴養管道：如果有管道能幫忙安置小貓和被棄養的家貓，照顧者和倡導街貓運動的人才能夠無後顧之憂地進行他們的任務。把貓一隻隻帶回家找認養人的時間若能省下來，便能更專注在捕捉和結紮之上。

六、群落註冊系統：貓群結紮和施打預防針之後應該予以統計，方便日後追蹤貓群數量的變化，或者萬一貓群裡的貓被抓到收容所時，能儘快找到原照顧者。需留下的資料必須包括：照顧者的聯絡方式，貓群的位置，及其每隻貓的外觀和病（顏色、年齡、結紮及施打預防針的時間，是否剪耳、晶片號碼〔若有施打〕），以利將來這些貓因故被捉進收容所時，有人可以負責領出或者和地主／屋主協商溝通。

七、法令或照顧者同意書：應和愛心照顧者訂定具有法律約束力的同意書，由你們為貓群提供資金、醫療服務等，而愛心照顧者則有責任遵守某些要求，例如：把貓帶去結紮、打狂犬病預防針，按時餵食並提供貓屋，維持餵食站清潔，更新貓群資料以及把小貓抓起來送養等等。

八、教育計劃：以TNR以及街貓照顧為基礎，固定開設照顧者訓練課程，能使整個計劃更容易推廣，運作更順暢。

九、提供食物：要促進TNR推動單位和愛心照顧者之間的合作愉快，沒有什麼比免費提供貓食更有效了，對只能領死薪水的人來說，餵養大批貓群是個沈重的經濟負擔。

十、官方支持的公開聲明：這對獲得當地居民信任和合作十分重要，特別是當該地過去曾有撲殺的紀錄的話。

本文發表於2003年香港Asia for Animals Conference

經Neighborhood Cats of New York City (www.neighborhoodcats.org)

網站授權翻譯，特此致謝！！